



BULLETIN TECHNIQUE

Par **Groupe Cérés** et **Nutrition Athéna**



ALIMENTATION DES PETITS PORCELETS ET PORCELETS DÉCROCHEURS

Dan Bussi eres, B.Sc., agr., Jean-Philippe Martineau, M.Sc., agr. & Martine Pelletier-Grenier, B.Sc., agr.
Sp ecialistes en alimentation porcine pour Nutrition Ath ena inc.

L'un des d efis qu'on peut rencontrer lorsqu'on d emarre un nouveau lot de porcs sevr es en pouponni ere sont les porcelets d ecrocheurs. Plusieurs facteurs peuvent en  tre la cause :  ge, poids, maladies, etc.

Pour rem edier   la situation, voici quelques suggestions   mettre en place pour r eduire l'incidence des porcelets d ecrocheurs et pour vous aider   leur fournir de meilleurs soins :

-   l'arriv ee des porcelets, il est conseill e de trier seulement les plus petits (environ 5-10 %). En effet, les regrouper dans des parcs permettra de proc eder   des interventions et de leur donner des traitements diff erents. Il est pr ef erable de s electionner un parc pr es d'une source de chaleur et o u les travailleurs circulent fr equemment pour permettre des interventions r eguli eres tout au long de la journ ee.
- Ces parcs de petits porcelets devront  tre soign es r eguli erement durant la journ ee (3-4 fois/jour). Assurez-vous,   chaque visite, de lever tous les porcelets afin de les stimuler   consommer la premi ere phase de la moul ee mise dans la mangeoire et dans les bols.
- Il est possible de mettre quelques gros porcelets   travers les plus petits pour qu'ils servent de professeurs. Ces gros porcelets comprendront rapidement o u manger et boire et les petits vont les imiter.
- L'utilisation de bols est recommand ee particuli erement pour les parcs de petits porcelets.
- Les parcs de petits porcelets doivent rester sur la *Miza 1* plus longtemps que les autres parcs. Au lieu

de 1,25 kg/porcelet de *Miza 1* recommand e, les petits porcelets devraient recevoir 2 kg/porcelet.

- Si vous commandez la *Miza 1* en vrac, nous sugg erons d'avoir quelques sacs de 25 kg qui peuvent  tre utilis es pour remplir le silo lorsqu'il est vide. Vous pouvez  galement avoir un charriot de moul ee *Miza 1* en r eserve.
- Lors des tourn ees de pouponni ere, si vous voyez des porcelets d ecrocheurs, il faut les regrouper ensemble et leur faire un gruaux liquide (bouette) dans les bols.
 - Il s'agit simplement de faire un m elange de *Miza 1* avec de l'eau (vous pouvez aussi mettre de la poudre de lait, si vous en avez   votre disposition).
 - Les porcelets doivent  galement avoir acc es   une mangeoire de moul ee *Miza 1* s echer.
 - Il faut couper l'eau du parc. Puisque ces porcelets s'ennuient de leur m ere, ils ont tendance   boire beaucoup et   refuser de manger. Couper l'eau les force   consommer le gruaux liquide et prendre go ut   manger.
 - Apr es 2-3 jours sur le gruaux liquide, il est important de leur redonner acc es   l'eau. Un porcelet boit presqu'un litre d'eau par jour, alors il ne sera pas suffisamment hydrat e par l'alimentation au gruaux liquide.
 - Les porcelets d ecrocheurs r etablis peuvent retourner dans des parcs conventionnels.

Une forte incidence de porcelets d ecrocheurs n'est pas normale. Si vous constatez que c'est le cas pour votre pouponni ere, contactez votre repr esentant pour  valuation et correction de la situation.